

บทที่ 4 ผลการวิจัย

จากการศึกษาความหลากหลายชนิดของเห็ดป่าในบริเวณพื้นที่ชุมชนป่าดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2559 พบเห็ดทั้งหมด 23 วงศ์ 43 สกุล 80 ชนิด จัดจำแนก เห็ดกินได้ 42 ชนิด เห็ดกินไม่ได้ 38 ชนิด (ตารางที่ 4.1)

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาชนิดเห็ดที่พบในชุมชนป่าดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

วงศ์	จำนวน
Agaricaceae	7
Auriculariaceae	1
Boletaceae	8
Cantharellaceae	1
Clavariaceae	6
Coprinaceae	1
Dacrymycetaceae	1
Entolomataceae	2
Ganodermataceae	2
Gloeophyllaceae	1
Hymanochaetaceae	3
Hymenogasteraceae	1
Marasmiaceae	4
Nidulariaceae	1
Pluteaceae	8
Polyporaceae	6
Russulaceae	15
Sarcosomataceae	1
Schizophyllaceae	1
Sclerodermataceae	3
Strophariaceae	1
Tricholomataceae	1
Xylariaceae	5

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาชนิดและนิเวศวิทยาของเห็ดที่พบในชุมชนป่าดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอลำดวน จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
1	เห็ดกระดุม ครีบกิ้งกร	-	<i>Agaricus romagnesii</i> Wass.	Agaricaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นลำตวน เกิดบริเวณพื้นที่มี หญ้าปกคลุม บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบ ในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม
2	-	-	<i>Inocybe</i> sp.	Agaricaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณบริเวณใต้ต้นจิก มีซากใบไม้ทับ ถมอยู่ เกิดอยู่บนดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะ พบในช่วงเดือนกันยายน
3	เห็ดต้นหอม ขาว	-	<i>Leucocoprinus</i> <i>cepaestipes</i> (Sow. ex Fr.) Pat.	Agaricaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นประดู่ เกิดอยู่กับดิน บริเวณ พื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย ดินมีความชุ่มชื้นมาก มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบ ในช่วงเดือนมิถุนายน
4	เห็ด ดาวกระจาย	-	<i>Leucocoprinus</i> <i>fragilissimus</i> (Rav.) Pat.	Agaricaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นนมน้อย ต้นพลองเหมือด บริเวณที่มีซากใบไม้ปกคลุม บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่แบบ กลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายน

ลำดับที่	ชื่อสามัญ	ชื่อ ท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
5	เห็ดนกยูง	เห็ดข้าว แป้ง	<i>Macrolepiota gracilentata</i> (Krombh. ex Fries) Mos	Agaricaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นจิวป่า เกิดอยู่กับดิน บริเวณ พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย มีซากใบไม้ปกคลุมอยู่ มักจะพบเกิดอยู่แบบเดี่ยว จะพบ ในช่วงเดือนมิถุนายน
6	เห็ดร้อย หวาย	-	<i>Marasmius aurantioferrugineus</i> Hongo	Agaricaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณใต้ต้นแดงและต้นหนามแท่ง เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่ทั้งแบบกลุ่มและแบบ เดี่ยว จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
7	-	-	<i>Marasmius Flordeus</i> Berk. & Br.	Agaricaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นแดง บริเวณซากใบไม้ หรือ ขอนไม้ที่ผุพัง บริเวณพื้นที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่รวมแบบกลุ่ม จะพบ ในช่วงเดือนกันยายน
8	เห็ดหูหนู	เห็ดหูหนู	<i>Auricularia polytricha</i> (Mont.) Sacc.	Auriculariaceae	พบบริเวณขอนไม้ต้นพญาสัตบรรณ บริเวณพื้นที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่ แบบกลุ่ม เกิดขึ้นเป็นกลุ่มกับท่อนไม้ผุของต้นเสมสาร จะพบในช่วงเดือนกรกฎาคมและ ตุลาคม
9	เห็ด กระบองเพชร เหลือง	-	<i>Boletellus russellii</i> (Frost) Gilb.	Boletaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณใต้ต้นพลองเหมือด บริเวณ พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย บริเวณพื้นมีซากใบไม้ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก มักจะพบ เกิดอยู่แบบกลุ่ม และจะพบในช่วงเดือนกรกฎาคม

ลำดับที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
10	เห็ดเสม็ด	เห็ดผึ้งยูคา, เห็ดผึ้งขม	<i>Boletus griseipureus</i> Cor.	Boletaceae	พบในพื้นที่ป่ายูคา พบบริเวณใต้ต้นยูคา บริเวณที่มีใบยูคาปกคลุมเยอะ เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทรายเหลือง มักจะเกิดอยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนมิถุนายน
11	เห็ดผึ้งขมิ้น	เห็ดผึ้งทอง	<i>Boletus junquilleus</i>	Boletaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณใต้ต้นยูคา ต้นพันชาดและต้นกระบก เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะพบเกิดอยู่ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
12	เห็ดตับเต่าดำ	เห็ดผึ้งทาม	<i>Phlebopus braunii</i> (Bres.) Singer	Boletaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังพบอยู่บริเวณใต้ต้นลำตวน เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทรายมีใบไม้ปกคลุมอยู่ มักจะพบเกิดอยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม
13	เห็ดผึ้งผงกำมะถัน	-	<i>Pulveroboletus ravenelii</i> (Berk. & Curt.) Murr.	Boletaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นพญาสัตบรรณ ต้นพันชาด เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มีซากใบไม้ปกคลุมอยู่ มักจะพบเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายน
14	เห็ดปอดดำ	เห็ดปอด	<i>Strobilomyces seminudus</i> Hongo	Boletaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบเกิดบริเวณใต้ต้นทุกวาง ต้นพลองเหมือด เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะพบเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนสิงหาคม

ลำดับที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
15	เห็ดผึ้งไวน์ อุงุ่น	เห็ดผึ้งดำ	<i>Tylopilus vinosobrunneus</i> Hongo.	Boletaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณใต้ต้นยูคา ต้นรังและต้นมะค่า แต่ เกิดอยู่กับดิน
					บริเวณพื้นที่ที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มีซากใบไม้ปกคลุมอยู่ มักจะพบเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนสิงหาคม
16	เห็ดผึ้งตอง	เห็ดผึ้ง ตอง	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L. : Fr.) Quel.	Boletaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณใต้ต้นพลองเหมือด ต้นหนาม แห้ง เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นที่ที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มีซากใบไม้ทับถมและปกคลุม อยู่เป็นจำนวนมาก มักจะพบเกิดอยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
17	เห็ดขม น้อย	เห็ดมันปู น้อย	<i>Cantharellus minor</i> Peck	Cantharellaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณใต้ต้นพญาสัตบรรณ และต้น ชาฮกเกี้ยน เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นที่ที่พบเป็นดินร่วนปนทราย ดินมีความชุ่มชื้นสูง มีใบไม้ ทับถมกันหนา ๆ มักจะพบเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
18	เห็ดปะการัง ขาว	-	<i>Clavulina cristata</i> var. <i>vaginata</i> (Bull. ex Fr.) Vitt.	Clavariaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นชันทองพญาบาทและต้น ตานกกด เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นที่ที่พบเป็นดินร่วนปนทราย ดินมีความชุ่มชื้น มีใบไม้ ทับถม มักจะเกิดอยู่แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือน กันยายน

ลำดับที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
19	เห็ดเข็มขาว	-	<i>Multiclavula mucida</i> (Pers. ex Fr.) Pet.	Clavariaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณขอนไม้พยอมที่ผุพัง หรือบริเวณที่มีสาหร่ายปกคลุมดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทรายมักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายน
20	เห็ดปะการัง เขากวางสี น้ำผึ้ง	-	<i>Phaeoclavulina apiculata</i> var. <i>brunea</i> (R.H. Petersen) Giachini	Clavariaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นชันทองพญาบาท มะค่าแต้ และพลองเหมือด บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนกันยายน
21	เห็ดปะการัง เขากวาง	-	<i>Scytinopogon angulisporus</i> (Pat.) Cor.	Clavariaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบเกิดขึ้นที่บริเวณใต้ต้นมะค่าแต้ ต้นชันทองพญาบาท และต้นพลองเหมือด เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นร่วนปนทราย และซากใบไม้ที่ทับถมกัน มักจะพบเกิดทั้งแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนมิถุนายน เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม
22	เห็ดโคน ปลวกสีส้ม	เห็ด ปลวก	<i>Termitomyces aurantiacus</i> (Heim) Heim	Clavariaceae	พบเกิดขึ้นที่บริเวณใต้ต้นกระโดนและต้นกระบก เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย มักจะพบเกิดอยู่ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม

ลำดับที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
23	เห็ดปลวก โคนโป่ง	เห็ด ปลวก ตาบใหญ่	<i>Termitomyces unkowaani</i> (Cke. & Mass.) Reid.	Clavariaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นอะราง และพบในบริเวณที่มีจอมปลวกและมีใบไม้ทับถมอยู่ บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทรายเหลือง มักจะพบเกิดอยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
24	เห็ดขี้วัว	-	<i>Copelandia cyanescens</i> (Berk. & Br.) Sing.	Coprinaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณเศษหญ้าแห้ง หรือตามที่มีกองขี้วัวอยู่ บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนกันยายน
25	เห็ดพายทอง , เห็ดวุ้นใบ พาย	เห็ดวุ้น ใบพาย	<i>Dacryopinax spathularia</i> (Schweinitz) Martin.	Dacrymycetaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบนขอนต้นไม้พยอมที่ผุพัง มักจะพบเกิดอยู่แบบกลุ่มกระจายกันอยู่ จะพบในช่วงเดือนกันยายน
26	เห็ดนมหมู	-	<i>Entoloma strictius</i> (Peck) Sacc.	Entolomataceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นพญาสัตบรรณและต้นสาบเสือ มีซากใบไม้ปกคลุม เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่มและแบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนกันยายน

ลำดับที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
27	เห็ดค้อ	-	<i>Leptonia formosa</i> (Fr.) Noorderloos	Entolomataceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นมะค่าแต่ เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย ดินที่มีความชุ่มชื้น มีใบไม้ปกคลุมอยู่ มักจะพบอยู่แบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
28	เห็ดหูช้าง	เห็ดหูช้าง	<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers. ex Wallr.) Pat.	Ganodermataceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบเกิดขึ้นกับต้นแสลงสารที่ยังมีชีวิตอยู่ มักจะเกิดอยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
29	เห็ดหิ้งก้อน กะละแมดำ	เห็ด กะละแม ดำ	<i>Ganoderma dahlii</i> (Henn.) Aoshima	Ganodermataceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบเกิดขึ้นอยู่กับข้างต้นพยอมที่ยังมีชีวิตอยู่ บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทรายหยาบ มักจะเกิดอยู่แบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
30	เห็ดหิ้ง น้ำตาล เหลืออง	-	<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Fries) Karsten	Gloeophyllaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบเกิดขึ้นกับต้นไม้มะค่าแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่ มักจะเกิดอยู่เป็นแผ่นแบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนกันยายน
31	เห็ดหิ้ง อบเชยขาว	-	<i>Coltricia cinnamomea</i> (Persoon) Murrill	Hymanochaetaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบในบริเวณใต้ต้นพลองเหมือด เกิดอยู่กับดิน บริเวณที่มีใบไม้ทับถมอยู่ บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มีความชุ่มชื้นสูง มักจะเกิดอยู่ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวจะพบในช่วงเดือนกันยายน

ลำดับที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
32	เห็ดมณฑาน้อย	-	<i>Coltricia montagnei</i> var. <i>montagnei</i> Fr.	Hymanochaetaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นแดง เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินทราย มักจะเกิดอยู่แบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนมิถุนายน
33	เห็ดน้ำผึ้งสยาม	-	<i>Inonotus rickii</i> (Pat.) Reid	Hymanochaetaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบเกิดขึ้นกับต้นมะค่าแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่ บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกาะติดอาศัยอยู่กับต้นไม้ มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายน
34	เห็ดขล้าหมา	เห็ดห้าพระ, เห็ดห้าฟาน	<i>Mycoamaranthus cambodgensis</i> (Pat.) S. Lumyong, R. Sunmee, P. Lumyong, Z.L. Yang & M. Trappe	Hymenogasteraceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นหนามแท่ง และต้นชันทองพญาบาท เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย มักจะพบเกิดอยู่แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม
35	เห็ดขนหางม้า		<i>Marasmius androsaceus</i> (L. ex Fr.) Fr.	Marasmiaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณขอนไม้ต้นแดงที่ผุและพื้นที่มีใบไม้ทับถมอยู่บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่มจะพบในช่วงเดือนตุลาคม

ลำดับที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
36	เห็ดรุ่มชมพู ม่วง		<i>Marasmius araneocephalus</i> Wannathes, Desjardin & Lumyong	Marasmiaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้น มะกอกเลื่อม เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นที่ที่พบเป็นดินร่วนปน ทราย มักจะเกิดอยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือน ตุลาคม
37	เห็ดรุ่มแดง หอม		<i>Marasmius jasminodorus</i> Wannathes, Desjardin & Lumyong	Marasmiaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้น มะกอกเลื่อม เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นที่ที่พบเป็นดินร่วนปน ทราย ดินมีความชุ่มชื้น มีใบไม้ทับถม มักจะเกิดอยู่ทั้งแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน
38	-	-	<i>Marasmius</i> sp.	Marasmiaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้น มะค่าแต้ เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นที่ที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มีใบไม้ปกคลุม มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือน กันยายน

ลำดับที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
39	เห็ดรังนกลาย	เห็ดรังนก	<i>Cyathus berkeleyanus</i> (Tul.) Lloyd	Nidulariaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณขอนไม้พยอม และต้นพลองเหมือดที่ผุพัง บริเวณพื้นที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายน
40	เห็ดไข่เน่า	-	<i>Amanita fuliginea</i> Hongo	Pluteaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นแดง บริเวณพื้นที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มีซากใบไม้ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก มักจะเกิดอยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนมิถุนายน
41	เห็ดเห้มนเปื้อ	-	<i>Amanita gymnopus</i> Cor. ex Bas.	Pluteaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นพลองเหมือด เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่แบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
42	เห็ดไข่เห็อง, เห็ดระโงก เห็อง	เห็ดระโงก เห็อง	<i>Amanita hemibapha</i> (Berk. & Br.) Sacc. subsp. <i>javanica</i> Cor. & Bas.	Pluteaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นพลองเหมือดและต้นลำตวน เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นที่พบเป็นดินร่วนปนทรายละเอียด พื้นดินจะมีความชุ่มชื้นสูง มักจะพบเกิดอยู่รวมกันแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนมิถุนายน

ลำดับที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
43	เห็ดเกลื่อ	เห็ดหน้าเกลื่อ	<i>Amanita onusta</i> (Cke. & Mass.) Reid.	Pluteaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบเกิดในบริเวณใต้ต้นมะหวด เกิดกับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะพบเกิดอยู่แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนมิถุนายน เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม
44	เห็ดหัวมะกรูด	-	<i>Amanita solitaria</i> (Bull. ex Fr.) Karst.	Pluteaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณใต้ต้นพันชาด เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย ดินมีความชุ่มชื้น มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
45	เห็ดไข่เหี่ยวม้า	เห็ดไส้เดือน	<i>Amanita vaginata</i> <i>var.vaginata</i> (Bull. ex Fr.) Vitt.	Pluteaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นยูคาและต้นพลองเหมือด เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มีซากใบไม้และหญ้าปกคลุม มักจะพบเกิดอยู่แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคม
46	เห็ดดอกกระถิน	-	<i>Amanita virginea</i> Mass.	Pluteaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นมะกอกเลื่อม เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย ดินที่มีความชุ่มชื้น มักจะเกิดอยู่แบบเดี่ยว

ลำดับที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
47	เห็ดฟางสีเปลือก มั่งคุด	-	<i>Pluteus cinereo-fuscus</i> Lge.	Pluteaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณใต้ต้นลำดวน เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทรายละเอียด มีใบไม้ปกคลุม มักจะเกิดอยู่แบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม
48	เห็ดเพ็ก, เห็ดหู กว้าง, เห็ดไผ่	เห็ดเพ็ก	<i>Lentinus strigosus</i> (Schwein.) Fr.	Polyporaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นหญ้าเพ็ก เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคม
49	เห็ดขอนกรวยม่วง	-	<i>Lentinus velutinus</i> Fr.	Polyporaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณขอนไม้ต้นตัวขาวที่ผุพัง บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทรายละเอียด มักจะเกิดทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนตุลาคม

ลำดับที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
50	เห็ดทานตะวันหนู	-	<i>Lentinus zeyheri</i> Berk.	Polyporaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นกระนวน เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย ดินมีความชุ่มชื้นสูง มักจะเกิดอยู่แบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
51	เห็ดหึ่งพัดเหลือง	-	<i>Lenzites betulina</i> (L.: Fries) Fries	Polyporaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบเกิดขึ้นกับต้นพลองเหมือดที่ยังมีชีวิตอยู่ มักจะเกิดอยู่แบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนมิถุนายน
52	เห็ดกาบหอยขาว	-	<i>Lenzites elegans</i> (Fr.) Pat.	Polyporaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณต้นพลองเหมือดที่ผุพังและซากใบไม้ บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนสิงหาคม เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม
53	เห็ดรังผึ้งสีขาว	-	<i>Polyporus retirugis</i> (Bres.) Ryv.	Polyporaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณข้างขอนไม้กระนวนที่ผุพัง มักจะเกิดอยู่แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม

ลำดับ ที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
54	เห็ดข่า	เห็ดข่า	<i>Lactarius flavidulus</i> Imai.	Russulaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นตะแบก ต้นตานกกด และต้นกุ่ม เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย มักจะพบเกิดอยู่แบบกลุ่มและแบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
55	เห็ดน้ำนมหน้าดำ ท้องขาว	-	<i>Lactarius lignyotus</i> Fr.	Russulaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณใต้ต้นหูกวาง เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
56	เห็ดหาด	-	<i>Lactarius volemus</i> Fr.	Russulaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณใต้ต้นจิกและต้นพันชาติ เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบ เป็นดินร่วนปนทราย มีซากใบไม้ทับถมอยู่ มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบอยู่ในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม
57	เห็ดน้ำแป้ง	-	<i>Russula alboareolata</i> Hongo.	Russulaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นพลองเหมือดและต้นพันชาติ เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย ดินจะมีความชุ่มชื้น มักจะพบเกิดอยู่ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน

ลำดับ ที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
58	เห็ดหน้าม่วง	เห็ดหน้าแห่	<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นรัง ต้นนมน้อย ต้นชันทองพญาบาทและต้นมะค่า แต่ เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มีซากใบไม้ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก มักจะเกิดอยู่แบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
59	เห็ดหล่มขาว	เห็ดตะไคลขาว	<i>Russula delica</i> Fr.	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นพลองเหมือด ต้นพยอม ต้นยางกราด เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม
60	เห็ดตีนดำ, เห็ดถ่านเล็ก	เห็ดถ่านเล็ก	<i>Russula densifolia</i> (Secr.) Gill.	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้นลำตวน ต้นหูวางและต้นชันทองพญาบาท เกิดกับดิน บริเวณพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย มีซากใบไม้ทับถมอยู่ มักจะพบเกิดอยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม

ลำดับ ที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
61	เห็ดแดงน้ำหมาก	เห็ดแดงน้ำ หมาก	<i>Russula emetic</i> (Schaeff. Ex Fr.) Pers. ex S.F. Gray	Russulaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ ต้นพันชาด ต้นแดง เกิดอยู่บนดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็น ดินร่วนปนทราย มักจะพบเกิดอยู่ทั้งแบบกลุ่มและแบบ เดี่ยว จะพบในช่วงเดือนกันยายน
62	เห็ดหล่มเหือง	เห็ดตะไคล เหือง	<i>Russula flavida</i> Frop ex Peck	Russulaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง จะพบอยู่ บริเวณใต้ต้นพลองเหมือด ต้นยางกราด ต้นพยอม ต้นอะ รางและโมกเครือ บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มีซากใบไม้ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก มักจะเกิดอยู่ทั้ง แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนมิถุนายน เดือน กรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายน
63	เห็ดหน้าวัว	เห็ดหน้าวัว	<i>Russula foetens</i> (Pers.) Fr.	Russulaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณ ใต้ต้นชันทองพยาบาทและต้นมะกอกเลื่อม เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มีความชุ่มชื้นสูง มีซากใบไม้ปกคลุมอยู่ มักจะเกิดอยู่แบบเดี่ยวและแบบ กลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน

ลำดับ ที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
64	เห็ดก่อแดง	เห็ดก่อแดง ใหญ่	<i>Russula luteotacta</i>	Russulaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ ต้นมะค่าแต้ ต้นพยอม เกิดกับดิน บริเวณพื้นดินเป็นดิน ร่วนปนทราย มักจะพบเกิดอยู่แบบกลุ่มและแบบเดี่ยว จะ พบในช่วงเดือนตุลาคม
65	เห็ดถ่านใหญ่	เห็ดถ่านใหญ่, เห็ดถ่านดำ ใหญ่	<i>Russula nigricans</i> (Bull.) Fr.	Russulaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณ ใต้ต้นหูกวาง มีซากใบไม้ทับถมอยู่เป็นจำนวนมาก เกิดอยู่ กับดิน บริเวณพื้นที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย มักจะพบเกิด อยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม
66	เห็ดแดงกุหลาบ	เห็ดหน้าแดง	<i>Russula rosacea</i> Pers. ex Ger	Russulaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ ต้นพลองเหมือด ต้นชันทองพญาบาท ต้นตานกกด ต้น พยอม ต้นกุ่ม เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินเป็นดินร่วนปน ทราย มักจะพบเกิดอยู่แบบเดี่ยว จะพบในช่วงเดือน กันยายนและเดือนตุลาคม

ลำดับ ที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
67	เห็ดหล่มม่วงแดง	เห็ดหล่มม่วง แดง	<i>Russula vinosa</i> Lindbl.	Russulaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ ต้นกระบกและต้นมะกอกเลื่อม เกิดอยู่กับดิน บริเวณ พื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มีซากใบไม้ปกคลุมอยู่ เป็นจำนวนมาก มักจะเกิดอยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม
68	เห็ดหล่มเขียว, เห็ด หล่มเขียวตกกระ	เห็ดตะไคล เขียว	<i>Russula virescens</i> Fr.	Russulaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ ต้นพลองเหมือด ต้นยางกราด ต้นพยอมน ต้นอะรางและต้น โมกเครือ เกิดอยู่บนดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปน ทราย มักจะเกิดอยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม จะพบ ในช่วงเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายนและ เดือนตุลาคม
69	เห็ดปากหมู	-	<i>Galiella rufa</i> (Schweinitz) Nannfeldt & Korf	Sarcosomataceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง เกิดอยู่กับดิน บริเวณใต้ต้นจิกและต้นแดง บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดิน ร่วนปนทราย ดินมีความชุ่มชื้นสูง มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนมิถุนายน

ลำดับ ที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
70	เห็ด ตีนตุ๊กแก	เห็ด ตีนตุ๊กแก	<i>Schizophyllum commune</i> Fries.	Schizophyllaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณขอน ไม้มะหวดที่ผุพัง มักจะพบเกิดอยู่แบบกลุ่ม กระจัดกระจาย อยู่ จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
71	เห็ดถอบ ฝ้าย	เห็ดเผา ฝ้าย	<i>Astraeus asiaticus</i> C. Phosri, M.P. Martin & R. Watling	Sclerodermataceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้น พยอมและต้นอะราง เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินเป็นดินร่วน ปนทราย มีซากใบไม้ปกคลุมอยู่ มักจะพบเกิดอยู่แบบกลุ่ม และจะพบในช่วงเดือนมิถุนายน
72	เห็ดถอบ หอม	เห็ดเผา หนัง	<i>Astraeus odoratus</i> C. Phosri, R. Watling, M.P. Martin & A.J.H Whalley	Sclerodermataceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง บริเวณใต้ต้น พยอมและต้นอะราง เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่เป็นดิน ร่วนปนทราย มักจะพบเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือน มิถุนายน
73	เห็ดตาโล่	เห็ดตาโล่	<i>Calostoma</i> sp.	Sclerodermataceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณใต้ต้น จิก เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายละเอียด มีซากใบไม้ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก มักจะพบเกิดอยู่แบบ กลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน

ลำดับ ที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้มที่พบ
74	เห็ดนาเม โก๊ะ	เห็ดนาเม โก๊ะ	<i>Pholiota nameko</i> (T. Ito) S. Ito & Imai	Strophariaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณใต้ต้นแดง เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย มักจะพบเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนตุลาคม
75	-	-	<i>Hygrocybe cantharellus</i> (Schw.) Murr.	Tricholomataceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง มักจะพบอยู่บริเวณใต้ต้นพลองเหมือด โดยพื้นที่บริเวณพื้นดินมีซากใบไม้ปกคลุมอยู่ บริเวณพื้นดินที่พบมีความชุ่มชื้นมาก มักจะเกิดอยู่ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
76	เห็ดก้าน รูป	-	<i>Xylaria brunneovinosa</i> Y.-M. Ju et H.-M. Hsieh	Xylariaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่กับขอนไม้ที่ผุพังของต้นพันชาติ หรือซากใบไม้ เกิดอยู่กับดิน บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายน
77	เห็ด เล็บมือนาง	เห็ด เล็บมือนาง	<i>Xylaria cubensis</i> (Mout.) Fr.	Xylariaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณต้นมะค่าแต่ที่ผุ บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย เหลือง มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม เป็นกระจุก ๆ

ลำดับ ที่	ชื่อสามัญ	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ลักษณะต้นไม้ที่พบ
78	-	-	<i>Xylaria oligotoma</i> Sacc. & Paol.	Xylariaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณขอนไม้กระนวนที่ผุพัง บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม จะพบในช่วงเดือนกันยายน
79	เห็ดนิ้วดำ	-	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers. ex Mer.) Gev.	Xylariaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบอยู่บริเวณขอนไม้พยอมที่ผุพัง บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดอยู่แบบกลุ่ม หรือเป็นกระจุก จะพบในช่วงเดือนกันยายน
80	เห็ดตะปู, เห็ด ดรรชนี นางไม้	-	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers. ex Mrat) Greville	Xylariaceae	พบในพื้นที่ป่าโคก ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พบบริเวณของไม้ประดู่ที่ผุพัง บริเวณพื้นดินที่พบเป็นดินร่วนปนทราย มักจะเกิดเป็นแบบกระจุก จะพบในช่วงเดือนตุลาคม

